La *T. Hageni* s'en distingue par sa taille beaucoup moins grande le triangle discoïdal des ailes inférieures libre; la lèvre supérieure noire; le dessin du thorax formant de chaque côté trois bandes jaunes dont chacune est divisée en deux taches superposées; les demi-anneaux jaunes de l'abdomen courts (à peu près comme chez le *Cordulegaster dorsalis* des mêmes contrées), enfin l'appendice inférieur sans dents de chaque côté après la base, mais muni au bout d'un tubercule médian.

Dans le Synopsis (Add. nº 116*bis*) il y a une erreur typographique grave; il faut lire pour les dimensions du mâle de la *Thoreyi :* abdomen 58; aile inférieure 51. La même erreur existe dans la Monographie, en ce qui concerne l'abdomen.

Le Secrétaire donne lecture du travail suivant :

DESCRIPTIONS D'OPILIONES NOUVEAUX

par M. Eug. Simon.

Egænus pachylomerus sp. nov. ♂ Long. 12.

Corps épais ovale, brun-fauve foncé, légèrement ponctué de fauve obscur; céphalothorax présentant en avant une fine ligne noire longitudinale, n'atteignant pas le mamelon et, de chaque côté, deux taches obliques et sinueuses, convergeant en avant. Céphalothorax présentant en avant un groupe de petits denticules irréguliers et sur les côtés quelques denticules très-espacés formant plusieurs lignes obliques. Abdomen marqué, au moins sur les trois premiers segments, de lignes transverses de denticules semblables, effacés sur les côtés. Bord antérieur presque droit, ni élevé, ni échancré. Mamelon brun foncé, petit, assez élevé, incliné en arrière, un peu plus long que large et légèrement canaliculé, armé de deux séries de tubercules aigus, dont le postérieur plus long et dirigé en arrière. Chélicères brun-rouge, avec le 1er article varié de fauve en dessus, l'extrémité du second et les doigts fauves; 1er article épais, long, convexe, garni en dessus de petits denticules irréguliers; 2e article pourvu à la base de très-petits denticules, ensuite inerme et lisse, grand, parallèle, un peu conique en dessus à la base; doigts très-épais et assez longs. Patte-mâchoire épaisse et assez courte; fémur noir éclairci aux extrémités; patella et tibia brun-rouge avec l'extrémité du tibia fauve, tarse fauve; fémur robuste, un peu courbe, armé en dessus de trois séries de forts denticules coniques et serrés, garni en dessous de denticules irréguliers; son angle supéro-interne saillant, arrondi; patella beaucoup plus longue que large, très-atténuée à la base, armée en dessus de deux séries de petits denticules n'atteignant pas le sommet, son

angle supéro-interne saillant en large apophyse courte garnie de crins; tibia environ de même longueur, inerme, faiblement atténué à la base; tarse grêle et long. Pattes fauve-rouge très-obscur, plus ou moins rayées de brun-foncé, avec le fémur, la patella et le tibia de la 1re paire brun rouge en dessus, noirs en dessous et le tibia rayé de fauve latéralement; pattes de la 1re paire très-épaisses et très-différentes des suivantes; leur fémur large, très-comprimé, claviforme, garni en dessous, dans toute sa longueur, de petits denticules irréguliers, non sériaux; tibia armé en dessous de deux séries très-régulières de denticules plus longs, aigus, augmentant de longueur de la base à l'extrémité; métatarse relativement court et grêle, garni en dessous de forts spicules noirs irréguliers, serrés, et armé à l'extrémité d'une apophyse perpendiculaire conique, plus longue que son diamètre; 1er article du tarse présentant une apophyse semblable, mais un peu plus courte et courbée en avant; fémurs des autres paires fortement anguleux, pentagonaux et pourvus de séries de denticules aigus très-réguliers; tibias fortement anguleux, inermes ou avec des séries inférieures de petits spicules. Hanches inermes, lisses, celles de la 1re paire beaucoup plus larges que les suivantes.

♀. Pattes fauve obscur avec les tibias rayés de brun; presque semblables, fortement anguleuses, avec les fémurs pourvus de séries de denticules, très-faibles en dessous à la 1re paire.

Abyssinie intérieure (Raffray).

Nota. Le genre *Egænus* C. Koch (1839), auquel il faut réunir le genre *Zacheus* du même auteur, renferme aujourd'hui deux espèces africaines : les *E. africanus* (sub *Zacheus*) Karsch, de Mozambique, et *pachylomerus* E. S., et sept espèces propres à l'Europe centrale et orientale; les trois (*convexus*, *tibialis* et *ictericus*) décrites par C. Koch, auxquelles il faut ajouter son *Zacheus mordax* (= *Ph. crista* Brullé) et trois espèces que j'ai décrites récemment (*Clairi*, *sinister*, *gulosus*).

Le tableau suivant résume les caractères des six espèces qui me sont connues :

1 Bord frontal droit non relevé. Tibias des quatre paires anguleux. Mamelon oculaire assez élevé. 2
 Bord frontal un peu échancré et relevé. Tibias cylindriques, au moins les antérieurs. Mamelon oculaire très-bas 4

2 Mamelon oculaire inerme. Chélicères très-volumineuses.
 gulosus E. Simon [1].
 Mamelon armé de deux séries de denticules. Chélicères médiocres . . 3

[1] E. Simon, *Comptes-rendus de la Soc. Ent. de Belgique*, séance du 20 nov. 1878; de Russie méridionale.

3 Corps inerme. Fémurs inermes non anguleux. Chez ♂ métatarse I sans apophyse terminale. **crista** Brullé [1].
Corps garni de denticules. Fémurs anguleux, pourvus de séries de denticules. Chez ♂ métatarse I armé d'une apophyse terminale. **pachylomerus** E. S. [2].

4 Bord antérieur et angles du céphalothorax mutiques. Corps gris blanchâtre ponctué de brun **Clairi** E. Simon [3].
Céphalothorax pourvu aux angles d'un groupe de denticules. Corps brun foncé ou noir 5
Premier article des chélicères et fémur de la patte-mâchoire inermes. Métatarse I grêle et cylindrique. **tibialis** C. Koch [4].
Premier article des chélicères garni en dessus et fémur de la patte-mâchoire en dessous, de nombreux denticules. Métatarse I fusiforme, large, atténué aux deux extrémités. **sinister** E. S. [5].

GENUS RHAMPSINITUS [6] nov. gen.

Téguments très-durs, coriacés. Corps convexe, presque parallèle, obtusément tronqué en arrière ; limite du céphalothorax indiquée par une profonde strie arquée en avant ; stries des cinq premiers segments abdominaux non indiquées. Mamelon oculaire élevé, comprimé, plus long que large, séparé du bord frontal par un espace un peu plus long que son grand diamètre. Chélicères plus longues que le corps, comme chez les *Ischyropsalis*. Épistome en lame verticale, terminée en pointe courte recourbée en bas. Pattes longues (les pattes-mâchoires sont mutilées).

Ce genre remarquable se place à côté des *Acantholophus*, il s'en distingue à première vue par ses grandes chélicères épineuses rappelant celles des *Ischyropsalis*.

Rhampsinitus Lalandei sp. nov. Long. 6, 5, larg. 5.

Corps brun-rouge vif; chélicères, pattes-mâchoires et pattes noires avec les doigts des chélicères et les derniers articles des pattes antérieures éclaircis rougeâtres. Assez convexe, large et court, presque parallèle, obtusément tronqué en arrière, entièrement garni en dessus de tubercules aigus, serrés, disposés sans ordre, un peu plus longs au bord postérieur, sur les côtés et en avant du mamelon oculaire. Mamelon oculaire élevé, plus long

(1) Brullé, *Expéd. sc. de Morée. Artic.* (1832) = *Zacheus mordax* C. Koch + *Z. trinotatus* C. K.; de Grèce et de Turquie.

(2) D'Abyssinie intérieure.

(3) E. Simon, *Ann. Soc. Ent. de France*, Bull. p. CXCVII, 1875; de Constantinople.

(4) C. Koch, Ar. V, f. 430 ; de Transylvanie.

(5) E. Simon, l. c., p. CXCVII ; de Constantinople.

(6) Nom propre.

que large, pourvu de deux séries de quatre longs tubercules aigus, équidistants, dont les antérieurs plus petits. Chélicères très-grandes : 1er article plus long que le céphalothorax, épais, légèrement comprimé, presque parallèle, entièrement garni de forts tubercules coniques, inégaux et irréguliers; second article plus long que le 1er, légèrement élargi de la base à l'extrémité, garni, à la base seulement, de petits tubercules irréguliers; doigts épais et courts. Pattes assez longues; fémurs anguleux, surtout les postérieurs, sub-pentagonaux, garnis dès la base de séries de forts denticules aigus, serrés; patellas armées de denticules plus petits; tibias non anguleux, un peu comprimés, présentant des séries de très-petits spicules espacés.

Cafrerie.

(Muséum de Paris, plusieurs exemplaires en mauvais état, provenant du voyage de De Lalande.)

GENUS PANTOPSALIS (1) nov. gen.

Téguments sub-coriacés. Corps très-court, presque arrondi; abdomen plus court que le céphalothorax, celui-ci très-élevé presque conique. Mamelon oculaire élevé, plus large que long, inerme, largement séparé du bord antérieur. Chélicères d'une longueur excessive, plus de quatre fois plus longues que le corps, leurs deux articles presque égaux; doigts robustes et courts. Pré-épistome très-grand, trapézoïde: épistome plus petit, en triangle avec le sommet un peu saillant et conique, mais non en forme de lame. Lobes maxillaires de la seconde paire, cylindriques, assez grêles, non atténués et obtus, dirigés obliquement en avant mais ne se rencontrant pas. Avance sternale de l'abdomen un peu élargie en avant et tronquée. Pièce anale petite, semi-circulaire, à peine aussi large que les bords réfléchis du 8e segment. Patte-mâchoire beaucoup plus courte que les chélicères; patella et tibia beaucoup plus longs que larges, presque d'égale longueur, sans brosse interne; griffe tarsale très-petite. Pattes très-longues et fines; tibia de la seconde paire et métatarses des 4 paires pourvus de fausses articulations.

Ce genre est le plus singulier de la famille des *Phalangiidæ;* par ses énormes chélicères, ayant plus de quatre fois la longueur du corps, il rappelle, même avec exagération, le genre *Ischyropsalis;* ses principaux caractères le rapprochent du genre *Gagrella* Stoll.

Pantopsalis Listeri White, Proceed. Zool. Soc. part. XVII, 1849 (sub *Phalangium*). Long. 5; chél. long. 25.

Corps très-noir, finement chagriné, présentant seulement en avant, sur le bord antérieur, un groupe de petits denticules irrégu-

(1) πᾶς totus et ψαλίς forfex.

liers. Chélicères noires, entièrement garnies de forts denticules obtus, inégaux, très-irréguliers, plus gros et plus serrés à l'extrémité du second article ; 1er article grêle, plus de deux fois plus long que le corps entier, faiblement élargi à l'extrémité ; 2e article plus long que le 1er, assez fortement élargi à l'extrémité en massue ovale ; doigts courts, très-robustes, pourvus chacun d'une forte dent médiane. Patte-mâchoire blanc-testacé avec le fémur brun-rouge. Pattes noires, cylindriques ; fémurs garnis de petits denticules irréguliers.

Nouvelle-Zélande (île du Milieu).

Le Muséum de Paris en possède trois exemplaires rapportés par M. Filhol.

GENUS TARACUS (1) gen. nov.

Céphalothorax à pièces épimériennes soudées, mais indiquées par une strie, à pores latéraux visibles, ovales. Mamelon oculaire bas, très-grand, ovale plus long que large, ni déprimé ni canaliculé. Pièce anale semi-circulaire. Stigmates visibles. Chélicères très-grandes, plus longues que le corps, leur 1er article beaucoup plus long que le céphalothorax; doigts assez grêles et longs. Épistome plan. Patte-mâchoire au moins aussi longue que le corps et assez robuste ; tibia aussi long que la patella, assez épais, brusquement atténué à l'articulation ; tarse beaucoup plus court que le tibia, fusiforme, replié en dessous. Abdomen présentant 6 segments ventraux, le 6e soudé au 5e dans le milieu, libre sur les côtés.

Très-voisin du genre *Ischyropsalis* dont il diffère par son mamelon oculaire plus long que large, nullement canaliculé, par le tarse de sa patte-mâchoire fusiforme et replié en dessous et surtout par la présence d'un 6e segment ventral avant la pièce anale; par sa patte-mâchoire il se rapproche du genre *Sabacon* E. S., mais il s'en distingue par ses chélicères très-longues et son épistome plan.

Taracus Packardi sp. nov. Long. 4-5.

Céphalothorax brun foncé ; abdomen gris testacé, violacé en dessus; chélicères très-noires; pattes-mâchoires et pattes brun-fauve. Céphalothorax finement chagriné ; partie antérieure au mamelon moins large que lui et déclive ; bord postérieur coupé d'une échancrure semi-circulaire, membraneuse et pourvue d'une épine grêle verticale. Mamelon très-grand, ovale peu convexe, plus long que large et lisse ; yeux petits, très-écartés transversalement. Abdomen très-finement chagriné, presque glabre. Chélicères très-grandes : 1er article aussi long que le céphalothorax et la moitié de la plaque abdominale, droit, cylindrique et parallèle, un peu inégal et irrégulièrement garni de petits tubercules inégaux sur-

(1) Nom propre.

montés de crins; 2e article plus long que le 1er, plus large, fusiforme allongé, atténué à la base mais sans pédicule distinct, garni comme le 1er, dans toute sa longueur, de petits tubercules crinigères disposés en séries longitudinales peu régulières. Patte-mâchoire : fémur grêle, parallèle, légèrement courbe, garni de crins très-espacés un peu plus courts que son diamètre; patella très-longue, droite et parallèle, garnie de crins semblables espacés; tibia de même longueur, très-légèrement courbe, brusquement atténué à la base, ensuite parallèle, garni de crins blancs dressés, serrés, disposés en brosse; tarse plus de deux fois plus court, ovale, acuminé, replié en dessous, garni de crins semblables. Hanches à bords lisses, non crénelés, garnies de crins, un peu soulevés aux premières paires. Pattes assez longues, assez robustes, garnies de crins courts, espacés, rudes; fémurs assez fortement élargis à l'extrémité, subclaviformes; métatarses pourvus de fausses articulations.

Colorado (reçu de M. Morrison).

Trogulus gypseus sp. nov. Long. 14.

Gris fauve terne, couvert en dessus de granulations assez fines, égales et serrées; séparation du céphalothorax indiquée par une strie; les 3 premiers segments abdominaux indiqués par des côtes transverses assez fortes, arquées; une côte médiane arrondie. Chaperon un peu plus long que large, arrondi en avant, à peine plus étroit que le bord antérieur du céphalothorax; saillie oculaire très-convexe, canaliculée; yeux gros, débordés, leur intervalle ayant environ trois fois leur diamètre. Dessous du corps finement et densément granulé, à 1re strie presque droite. Patte-mâchoire fauve avec le tarse brunâtre; patella et tibia garnis de crins simples, plus longs et plus serrés en dessus, surtout au bord interne. Pattes gris-blanc avec les tarses brunâtres, finement rugueuses, garnies de crins simples courts blancs, mêlés aux métatarses de crins noirs plus forts et courts; fémur II sans crête en dessus; métatarse IV sans épines claviformes; apophyse tibiale des métatarses, forte aux paires 1, 3 et 4, sensible à la paire 2; tarses relativement très-courts aux quatre paires; à la paire 2 presque deux fois plus court que le métatarse; à la paire 4 dépassant l'apophyse métatarsale de son dernier article seulement.

Jérusalem (C. de la Brûlerie).

Cette grande espèce se distingue facilement à la brièveté de ses tarses, et à la présence d'une apophyse métatarsale à la seconde paire de pattes.

M. Dietz adresse la liste suivante de quelques Carabiques et Brachélytres pris par lui à l'excursion faite à Ruysbroeck le 14 avril :